





# 世界华人消化杂志®

## WORLD CHINESE JOURNAL OF DIGESTOLOGY

Shijie Huaren Xiaohua Zazhi

2003年7月15日 第11卷 第7期

(Volume 11 Number 7)



### 7/2003

ISSN 1009-3079



名誉总编辑

潘伯荣

总编辑

马连生

World Journal of Gastroenterology® 被 SCI® -E, Research Alert, Current Contents® /Clinical Medicine, Journal Citation Reports, Index Medicus, MEDLINE, Chemical Abstracts, EMBASE/Excerpta Medica 收录. 2002 年 JCR® 报告 WJG 影响因子 2.532. 世界华人消化杂志® 被 Chemical Abstracts, EMBASE/Excerpta Medica 收录. 2001 年中国科技期刊引证报告: 世界华人消化杂志® 影响因子 3.733, WJG 影响因子 2.920.

# 世界华人消化杂志

Shijie Huaren Xiaohua Zazhi

● 目 次 ●

2003年7月15日 第11卷 第7期 (总第111期)

述 评	881 一种新型传染病: 严重急性呼吸综合征 聂青和, 罗新栋, 惠武利 888 病毒性肝炎发病机制中的反式调节机制 成军 897 老年消化系疾病的中西医结合治疗 张万岱
肝 癌	900 经动脉灌注蜂毒素-聚乳酸/羟乙酸微球治疗大鼠肝肿瘤 凌昌全, 李琦, 刘晓华, 陈庆华, 彭永海, 罗若茵, 黄雪强 904 大鼠肝癌形成过程中癌基因表达变化的意义 薛玲, 廖冰, 赵国强, 胡瑞德, 车丽洪, 董郡 908 参白胶囊诱导肝癌 SMMC-7721 细胞凋亡 吴苏冬, 刘长利, 王慧川, 鲍德虎 912 肝细胞癌肝动脉化疗栓塞后 PCNA 和 nm23-H1/NDPK 的研究 冯勇, 赵玲, 张爱华, 刘康达, 刘来村, 王彦辉, 尹进强, 杨秉辉 916 TDI-FP 法分析肝细胞癌组织中 HBV 核心启动子双突变 吕贯廷, 卢冰, 白玉杰, 张剑, 阎小君
病毒性肝炎	920 基因表达谱芯片技术筛选乙型肝炎病毒 X 蛋白反式调节基因 成军, 刘妍, 洪源, 王建军, 杨倩 925 乙型肝炎病毒 X 蛋白反式激活基因 10 的克隆化研究 成军, 刘妍, 洪源, 王琳, 钟彦伟, 董菁, 王刚 930 基因表达谱芯片技术筛选丙型肝炎病毒非结构蛋白 3 反式调节靶基因 成军, 刘妍, 洪源, 王建军, 杨倩 935 丙型肝炎病毒非结构蛋白 5A 反式激活基因 10 的克隆化研究 成军, 刘妍, 洪源, 王琳, 钟彦伟, 董菁, 王刚 939 应用表达谱芯片技术对丙型肝炎病毒非结构蛋白 5A 反式调节基因的研究 洪源, 刘妍, 成军, 杨倩, 王建军 943 应用表达谱芯片技术对截短型乙型肝炎病毒表面抗原中蛋白反式调节基因的研究 洪源, 刘妍, 成军, 杨倩, 王建军 947 丙型肝炎病毒核心蛋白上调细胞周期调节蛋白 Wee1 基因表达研究 王建军, 刘妍, 成军, 杨倩, 杨艳杰 951 丙型肝炎病毒核心蛋白上调 NIP3 基因表达研究 王建军, 刘妍, 成军, 杨倩, 杨艳杰 955 丙型肝炎病毒核心蛋白上调层粘蛋白 B1 链基因启动子表达活性的研究 杨倩, 刘妍, 成军, 王建军, 杨艳杰, 张树林 959 丙型肝炎病毒核心蛋白结合蛋白 6 上调新生多肽相关复合物 $\alpha$ 多肽基因的表达 杨倩, 刘妍, 成军, 李克, 王建军, 洪源, 张树林 963 乙型肝炎肝纤维化及癌变时脾脏超声影像, HBV e 系统及 APF 水平 柯伟民, 林国莉, 叶一农, 赖箐, 李建国 966 乙型肝炎病毒核壳蛋白变异株在 HepG <sub>2</sub> 细胞的 HLA-I 表达 陈伟红, 何海棠, 张明霞, 刘志华, 周永兴
基础研究	970 联合应用粉防己碱与甘草酸抑制肝纤维化大鼠细胞外基质表达 王志荣, 陈锡美, 李定国, 魏红山, 黄新, 展玉涛, 陆汉明 975 复方红景天干预肝纤维化大鼠胶原代谢 曾维政, 吴晓玲, 蒋明德, 邓桂英, 陈晓斌, 张勇, 秦建平, 徐辉 979 选择性环氧合酶-2 抑制剂 Celebrex 对胰腺癌 PGE <sub>2</sub> 和血管内皮因子表达的影响 谢传高, 王兴鹏, 董育玮, 杜勤, 蔡建庭, 钱可大 982 早期肠道营养减轻烧伤后肠黏膜损伤的机制研究 彭毅志, 袁志强, 肖光夏 986 胃肠道平滑肌细胞作为 eNOS 基因转移靶细胞的研究 宁守斌, 张忠兵, 沈茜, 谢渭芬, 杨秀疆, 赵新, 信栓力 990 内皮素-1 特异性抗体对应激性胃黏膜损伤的保护作用 段义民, 李兆申, 湛先保, 龚燕芳, 许国铭 994 肠三叶因子在胃黏膜应激性损伤中的修复作用 李兆申, 聂时南, 湛先保, 龚燕芳, 屠振兴, 许国铭 997 p <sup>53</sup> 突变与 VEGF 在大鼠胃癌中的表达及中药胃康宁的防治作用 李庆明, 余谦, 闵存云
焦点论坛	1001 乙型和丙型肝炎病毒蛋白反式激活作用机制及其意义的研究进展 成军 1002 乙型肝炎病毒表面抗原基因启动子 I 结构及调节研究 李强, 成军, 程明亮, 钟彦伟 1004 乙肝病毒表面抗原基因启动子 II 的结构及调节研究 梁耀东, 成军, 陆荫英, 吴君, 程明亮 1006 乙型肝炎病毒核心启动子的结构及调节研究 杨艳杰, 成军, 陈东风, 刘妍, 杨倩, 王建军 1008 乙型肝炎病毒增强子的结构和调控研究 王建军, 成军, 刘妍, 张忠东, 杨倩, 杨艳杰 1011 丙型肝炎病毒核心蛋白反式激活作用的研究 杨艳杰, 成军, 陈东风, 钟彦伟, 张忠东, 李强

## 焦点论坛

- 1014 丙型肝炎病毒复制子的研究 纪冬, 成军, 王建军  
 1018 丙型肝炎病毒 NS5A 蛋白的反式激活作用研究 王建军, 刘妍, 成军, 杨倩, 杨艳杰  
 1020 丙型肝炎病毒 5' - 非翻译区的结构与功能研究 杨倩, 成军, 刘妍, 王建军, 张树林  
 1023 乙型和丙型肝炎病毒蛋白对 14-3-3 蛋白信号转导的影响 成军  
 1027 乙型和丙型肝炎病毒蛋白对蛋白酪氨酸激酶信号转导的影响 张忠东, 成军, 钟彦伟, 张树林

## 课堂讨论

- 1031 北京大学医学部研究生分子肿瘤学课堂讨论及学术论坛纪要 吕有勇, 许小青

## 文献综述

- 1035 骨髓源性肝干细胞的研究进展 杨明智, 彭志海  
 1037 ERK 信号传导通路与肝星状细胞周期调控 蒋明德, 马洪德, 解方为  
 1040 趋化因子与肝病的研究进展 胡迎宾, 田德安, 刘南植  
 1043 游离脂肪酸、胰岛素抵抗与非酒精性脂肪性肝炎 高志强, 陆付耳  
 1046 KAI1 基因在胰腺癌中抗转移作用的研究 任丽楠, 刘民培, 郭晓钟, 徐建华, 安天义  
 1050 结直肠癌发病率及解剖部位变化趋势 谢正勇, 卿三华  
 1054 微阵列技术及其在消化系疾病研究中的应用进展 李新华, 张万岱, 肖冰, 张振书  
 1059 NO 和 VIP 与胃肠电-机械活动的关系 章敏, 曲瑞瑶  
 1064 TK 基因治疗胃肠道肿瘤的研究进展 刘占奎, 张超  
 1068 自由基损伤在幽门螺杆菌相关胃病中的作用 陶惠, 朱道银, 邹全明, 毛旭虎

## 消息

- 907 欢迎订阅 2003 年度世界华人消化杂志  
 915 欢迎订阅 2003 年度 World Journal of Gastroenterology®  
 946 世界华人消化杂志和 WJG 获得商标注册  
 950 中国科技期刊走向世界的步伐正在加快  
 954 世界华人消化杂志和 World J Gastroenterol 电子版目次  
 985 美国国立医学图书馆 2002 年度收录中国医学期刊名单  
 993 世界胃肠病学杂志英文版获得 2003-2004 年国家自然科学基金重点学术期刊专项基金资助  
 1030 世界胃肠病学杂志英文版获得第二届国家期刊奖百种重点期刊  
 1053 WJG 搭建我国消化学基础和临床研究惟一国际交流的平台  
 1058 提供您使用世界华人消化杂志和 World J Gastroenterol 电子版  
 1063 世界华人消化杂志获得 2001 年度百种中国杰出学术期刊  
 附 1 Journal Citation Reports 2002-China  
 附 2 Journal Citation Reports 2002-GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY  
 附 3 2003 年 Index Medicus 收录中国期刊  
 附 4 2003 年 ISI 收录中国科技期刊

## 封面故事

- 970 联合应用粉防己碱与甘草酸抑制肝纤维化大鼠细胞外基质表达 王志荣, 陈锡美, 李定国, 魏红山, 黄新, 展玉涛, 陆汉明

# 世界华人消化杂志

Shijie Huaren Xiaohua Zazhi

吴阶平 题写封面刊名  
 陈可冀 题写版权刊名  
 (月刊)

创刊 1993-01-15

改刊 1998-01-25

出版 2003-07-15

原刊名 新消化病学杂志

总顾问 陈可冀  
 黄象谦  
 黄志强  
 黎介寿  
 刘耕陶  
 裘法祖  
 汤钊猷  
 王宝恩  
 危北海  
 吴孟超  
 吴咸中

张金哲  
 张学庸  
 赵东海  
 周殿元  
 社长总编辑 马连生  
 中文编辑 潘伯荣  
 王瑾晖  
 英文编辑 张建中  
 排版 李少华  
 校对 李天华

编辑 世界华人消化杂志编辑委员会  
 030001, 山西省太原市双塔西街 77 号  
 E-mail: wjcd@wjgnet.com

出版 世界胃肠病学杂志社  
 100023, 北京市 2345 信箱  
 E-mail: wjcd @ wjgnet.com

http://www.wjgnet.com

电话 (010)85381892

传真 (010)85381893

印刷 北京科信印刷厂

发行 国内 北京报刊发行局  
 国外 中国国际图书贸易总公司  
 (100044, 北京 399 信箱)

订购 全国各地邮电局

邮购 世界胃肠病学杂志社发行部  
 (100023, 北京市 2345 信箱)  
 电话:(010)85381892

传真:(010)85381893

2003 年版权归世界胃肠病学杂志社所有

## 本刊已被国内外检索系统收录

美国《化学文摘(CA)》  
 荷兰《医学文摘库/医学文摘(EM)》  
 俄罗斯《文摘杂志(PЖ)》  
 中国科技论文统计与分析  
 中国学术期刊文摘  
 中国中医药信息服务网  
 中国生物医学文献光盘数据库  
 《中文科技资料目录(医药卫生)》  
 中国生物医学期刊目次数据库  
 中国医学文摘外科学分册(英文版)  
 中国医学文摘内科学分册(英文版)

## 特别声明

本刊刊出的所有文章不代表世界胃肠病学杂志社和本刊编委会的观点, 除非特别声明. 本刊如有印装质量问题, 请向本刊编辑部调换.

ISSN 1009-3079

CN 14-1260/R

邮发代号

82-262

国外代号

M 4481

国内定价

每期 24.00 元 全年 288.00 元

广告经营许可证

1401004000050

# TDI-FP法分析肝细胞癌组织中HBV核心启动子双突变

吕贵廷, 卢冰, 白玉杰, 张剑, 阎小君

吕贵廷, 白玉杰, 张剑, 阎小君, 中国人民解放军第四军医大学全军基因诊断技术应用研究所 陕西省西安市 710032

卢冰, 九江市卫生防疫站 江西省九江市 332000

吕贵廷, 男, 1978-03-28, 河南省许昌人, 汉族, 2000年河南师范大学生命科学学院毕业, 现为第四军医大学全军基因诊断技术应用研究所生物化学与分子生物学专业硕士研究生。

项目负责人: 阎小君, 710032, 陕西省西安市长乐西路17号, 中国人民解放军第四军医大学全军基因诊断技术应用研究所。

电话: 029-3374771

收稿日期: 2002-08-17 接受日期: 2002-09-12

## Paired mutation in core promoter region of HBV in hepatocellular carcinoma by TDI-FP assay

Guan-Ting Lü, Bing Lu, Yu-Jie Bai, Jian Zhang, Xiao-Jun Yan

Guan-Ting Lü, Yu-Jie Bai, Jian Zhang, Xiao-Jun Yan, The Institute of Genetic Diagnosis, PLA, Fourth Military Medical University, Xi'an 710032, Shaan'xi Province, China

Bing Lu, Sanitation and Anti-epidemic Station, Jiu Jiang 332000, Jiang'xi Province, China

Correspondence to: Xiao-Jun Yan, the Institute of Genetic Diagnosis, Fourth Military Medical University, Xi'an 710032, Shaan'xi Province, China. yanxj@37c.com.cn

Received: 2002-08-17 Accepted: 2002-09-12

## Abstract

AIM: To detect the A<sub>1762</sub>T and G<sub>1764</sub>A paired mutations in the core promoter region of the HBV DNA in the hepatocellular carcinoma, to investigate the relationship between them, and to establish a new method for genotyping of mutation patterns.

METHODS: The target DNA fragment of the HBV core promoter region which contains the paired mutations was amplified by polymerase chain reaction and the FP value of the R110- or TAMRA-labeled ddNTP was detected by TDI-FP assay to determine the nt1762 and nt1764 genotype.

RESULTS: Of 20 cases of hepatocellular carcinoma, 18 (90%) was positive for HBV infection. Through TDI-FP assay, there were 13/20 for T<sub>1762</sub> and A<sub>1764</sub> paired mutations, 1/20 heterozygous for T<sub>1762</sub>-A<sub>1764</sub>/A<sub>1762</sub>-G<sub>1764</sub>, 4/20 negative for the TDI-FP assay. By sequencing, the positive and heterozygous mutations completely accorded with the TDI-FP assay. In the negative results, 2/4 had 8-nucleotide deletion mutation, thus the mutation detection primer could not complement with the template and gave rise to the "false" negative results. The rate of T<sub>1762</sub>-A<sub>1764</sub> positive mutation rate of HBV DNA in hepatocellular carcinoma was 85%, heterozygous 5%, and wild-type 10%.

CONCLUSION: The HBV infection is very high in the hepatocellular carcinoma. The great frequency of the paired mutations in the core promoter indicates that the paired mutations may be significantly related to the pathogenesis of hepatocellular carcinoma. The established TDI-FP is

suitable for high throughput and automated genotyping assays due to its rapid and simple manipulation.

Lü GT, Lu B, Bai YJ, Zhang J, Yan XJ. Paired mutation in core promoter region of HBV in hepatocellular carcinoma by TDI-FP assay. *Shijie Huaren Xiaohua Zazhi* 2003;11(7):916-919

## 摘要

目的: 通过TDI-FP法检测肝细胞癌组织中HBV DNA核心启动子区A<sub>1762</sub>T和G<sub>1764</sub>A双突变并分析二者之间的相关性, 同时建立一种新的突变检测方法。

方法: 以20例肝细胞癌组织为研究标本, 通过PCR扩增含有HBV DNA核心启动子区的DNA片段, 然后用TDI-FP法检测R110或TAMRA标记ddNTP的FP值, 鉴定nt1762和nt1764的基因型。

结果: 20例肝细胞癌组织中经HBV检测试剂盒鉴定后, 18例为HBV感染阳性, 阳性率为90%。经TDI-FP检测, 其中有13例为T<sub>1762</sub>和A<sub>1764</sub>双突变型, 1例为T<sub>1762</sub>-A<sub>1764</sub>/A<sub>1762</sub>-G<sub>1764</sub>突变杂合型, 4例检测结果为阴性。经测序, 阳性结果及突变杂合型与TDI-FP结果完全吻合, 阴性结果中2例在nt1762前有8个核苷酸缺失突变, 导致突变检测引物无法与模板结合, 故产生TDI-FP检测出现假阴性结果。在肝细胞癌组织HBV DNA中, T<sub>1762</sub>-A<sub>1764</sub>突变阳性率为75%, 突变杂合型为5%, 野生型为10%。

结论: 在肝细胞癌组织中, HBV感染率非常高, 而且其核心启动子区出现nt1762和nt1764双突变率较高, 提示双突变与肝细胞癌关系密切; 同时本实验所建立的TDI-FP法操作快速简便, 可以进行高通量自动化操作, 具有进一步推广应用的前景。

吕贵廷, 卢冰, 白玉杰, 张剑, 阎小君. TDI-FP法分析肝细胞癌组织中HBV核心启动子双突变. *世界华人消化杂志* 2003;11(7):916-919

<http://www.wjgnet.com/1009-3079/11/916.asp>

## 0 引言

乙型肝炎病毒(hepatitis B virus, HBV)感染已经成为影响人们健康的主要威胁<sup>[1,2]</sup>, 目前全世界大约有3亿5千万人为乙型肝炎病毒携带者<sup>[1]</sup>。我国在世界上属于HBV感染的高发区, HBsAg阳性携带者约占总人口的10%<sup>[3-5]</sup>, HBV感染和许多肝脏疾病有关, 如急性肝炎、爆发性肝炎、无症状携带、慢性肝炎、肝硬化和肝细胞癌(hepatocellular carcinoma, HCC)等<sup>[1,6,7]</sup>, 而且越来越

多的证据表明, HBV 还能够感染外周血单个核细胞, 与淋巴系统疾病有关, 诸如非霍奇金淋巴瘤<sup>[8]</sup>. 研究表明, 乙肝病毒感染是肝细胞癌的主要致病因素<sup>[9]</sup>. 在 HBV 感染高发区, 二者的关系尤为显著<sup>[10]</sup>. 乙肝病毒突变率很高, 大约每年在  $2 \times 10$  个碱基中就有一个被置换<sup>[11]</sup>. 其中最重要、最常见的是在核心启动子(core promoter, CP)第二个 AT 丰富区的 A<sub>1762</sub> T 和 G<sub>1764</sub> A 突变, 二者经常同时出现, 与肝脏疾病关系如肝细胞癌较为密切<sup>[12-14]</sup>. 双突变可以减少 HBeAg 的分泌, 却又可以增加病毒前基因组的复制<sup>[15,16]</sup>. HBV DNA 的双突变对其致癌机制的研究具有重要意义.

本研究采用 TDI-FP(template-directed dye-terminator incorporation with fluorescence polarization, TDI-FP)<sup>[17]</sup> 的方法来分析肝细胞癌组织中 HBV 的双突变基因型, 他简便易行, 可以实现高通量和自动化操作, 为进一步研究 HBV DNA 的突变及基因型与临床意义建立方法学基础.

## 1 材料和方法

### 1.1 材料

由第四军医大学第一附属医院肝胆外科和第二附属医院传染科提供 20 例肝细胞癌组织(经第四军医大学病理科作病理切片鉴定), 其中男性 9 例, 女性 11 例. wallac VICTOR<sup>2</sup><sub>TM</sub> 1 420 multilabel counter, 480 nm/30、535 nm/40、544nm/15、595AF60 滤光片(PerkinElmer Life Sciences); MJ Research V2.0 384 微孔板(MJ Research); Techgene PCR Amplifier (Techne); Taq DNA 聚合酶(Takara); Wizard<sup>®</sup> Plus Minipreps DNA purification System, Wizard<sup>®</sup> PCR Preps DNA Purification System pGEM<sup>®</sup> T-easy Vector (Promega); AcycloPrime<sup>™</sup>-FP SNP Detection Kit (PerkinElmer Life Sciences); HBV DNA Detection Kit (Takara); 所用引物由上海生工公司合成, 其序列见下表:

引物	序列(5'→3')	位置(bp)	长度
P1	5' -GGTCAACGACCTGGATTGAG-3'	1 681-1 700	
P2	5' -GGCAGAGGTGAAAAAGTTGC-3'	1 818-1 835	155 bp
P <sub>1762</sub>	5' -GAGTCGGGGGAGGAGCTGAGGTTAA-3'	1 737-1 761	
P <sub>1764</sub>	5' -GTCGGGGGAGGAGCTGAGGTTAAAG-3'	1 739-1 763	

HBV DNA PCR 扩增引物 P1、P2 和突变检测引物 P<sub>1762</sub>、P<sub>1764</sub>.

## 1.2 方法

### 1.2.1 肝细胞癌组织的处理及 HBV 鉴定

取 5 g 组织于 1 mL 生理盐水中, 反复冻融 5 次, 然后研磨成匀浆, 10 000 rpm 离心 10 min, 取上清, 加 EDTA(PH8.0)、蛋白酶 K 和 SDS 至终浓度分别为 0.1 mmol/L、1 % 和 150 μg/mL, 37 °C 孵育 20 h, 加入 RNase 至终浓度为 20 μg/mL, 37 °C 继续孵育 1 h. 加等体积酚 - 氯仿 - 异戊醇(25 : 24 : 1), 混匀, 14 000 rpm 离心 10 min; 重复抽提 1 次, 加入 1/3 体积的乙酸钠(3 mol/L)和 2 倍

体积的冷无水乙醇, 14 000 rpm 离心 5 min, 弃上清; 70 % 洗涤沉淀, 晾干后, 用 100 μL TE 溶解. 用 HBV 检测试剂盒对所提取的 HBV DNA S 基因进行巢式 PCR (nested PCR) 鉴定 HBV.

### 1.2.2 目的片断的 PCR 扩增

取 2 μL 做 PCR 模板, 反应体系为: MgCl<sub>2</sub>、dNTPs (10 mM) 和 10×Buffer 各 2.5 μL, P1 和 P2 各 1 μL, Taq DNA 聚合酶 1 U, 加水补足 25 μL. 反应条件为: 95 °C 预变性 3 min; 然后 95 °C 变性 30 s, 55 °C 退火 30 s, 72 °C 延伸 30 min, 进行 30 个循环; 72 °C 延伸 5 min. 取 5 μL PCR 扩增产物在 1.2 % 琼脂糖凝胶电泳, 溴化乙啶染色.

### 1.2.3 TDI-FP 检测 HBV A<sub>1762</sub> → T 和 G<sub>1764</sub> → A 突变

MJ Research V2.0 384 微孔板每孔加入 5 μL PCR 扩增产物 (50-500 fmol/5 μL), 然后加入 2 μL 1×PCR 消化酶(核酸外切酶 I 和虾碱性磷酸酶), 37 °C 反应 1 h, 清除游离的 PCR 引物 P1 和 P2 及 dNTPs; 80 °C 水浴 15 min, 失活 PCR 消化酶. 随后每孔加入 13 μL AcycloPrime-FP 混合物(AcycloPol 聚合酶 0.05 μL, 10× 反应缓冲液 2 μL, R110-ddATP 和 TAMRA-ddTTP 混合液 1 μL, P<sub>1762</sub> 0.5 μL, 加水补足 13 μL). 在检测 G<sub>1764</sub>A 突变时, 操作步骤同前, 只是所加的荧光素标记的 ddNTP 及引物不同, 他们为 R110-ddGTP、TAMRA-ddATP 和 P<sub>1764</sub>. 然后把微孔板置于热循环仪, 95 °C 预变性 2 min; 95 °C 15s, 63 °C 30 s, 共 25 个循环; 室温 15 min. 微孔板在 wallac 1 420 VICTOR<sup>2</sup><sub>TM</sub> 1 420 multilabel counter 上分别检测 R110 和 TAMRA 的 FP 值.

### 1.2.4 PCR 扩增产物的克隆及测序

取 3 μL 胶回收的 PCR 扩增产物与 pGEM<sup>®</sup> T-easy 载体连接, 4 °C 过夜; 按常规方法转化 E. Coli DH5 α 感受态细菌, 加入 20 mL LB 培养基 37 °C 快速振荡至 A=0.6. 提取质粒 DNA, 用 EcoR I 酶切及 PCR 扩增鉴定. 另取 20 μL 送上海基康公司进行测序鉴定.

## 2 结果

### 2.1 提取的基因组 DNA 经 HBV 鉴定试剂盒检测

20 例肝细胞癌患者中有 18 例为 HBV 感染阳性, 2 例为阴性; HBV 感染阳性率 90 %.

### 2.2 TDI-FP 检测

20 例肝细胞癌组织扩增的含核心启动子区的 PCR 产物经 TDI-FP 检测后发现, 有 13 例为 T<sub>1762</sub> 突变型, 1 例为 T<sub>1762</sub>/A<sub>1762</sub> 突变杂合型, 2 例为 A<sub>1762</sub> 野生型, 4 例检测结果为阴性(包括 2 例 HBV 感染阴性组织); 13 例为 A<sub>1764</sub> 突变型, 1 例为 A<sub>1764</sub>/G<sub>1764</sub> 突变杂合型, 2 例 G<sub>1764</sub> 野生型, 4 例检测结果为阴性(包括 2 例 HBV 感染阴性组织). 经分析, 有 13 例肝细胞癌组织 HBV 出现 T<sub>1762</sub> 和 A<sub>1764</sub> 双突变; 1 例出现 T<sub>1762</sub>-A<sub>1764</sub>/A<sub>1762</sub>-G<sub>1764</sub> 杂合型; 2 例肝细胞癌组织中无 HBV 检测, 故双突变检测为阴性; 还有 2 例 HBV DNA 感染阳性组织检测结果也为阴性, 原因未明.




图1 A<sub>1762</sub> → T突变的TDI-FP检测结果.所用ddNTP为R110-ddATP和TAMRA-ddTTP,左上角为T/T纯合子区,右上角为T/A杂合子区,左下角为阴性对照及PCR失败样本区,右下角为A/A纯合子区(阴性对照的mP值分别为R110 38.0、TAMRA 42.0和R11039.0、TAMRA 52.0;阳性对照的mP值分别为R110 197.0、TAMRA 57.0和R110 198.0、TAMRA 66.0).




图2 G<sub>1764</sub> → A突变的TDI-FP检测结果.所用ddNTP为R110-ddGTP和TAMRA-ddATP,左上角为A/A纯合子区,右上角为A/G杂合子区,左下角为阴性对照及PCR失败样本区,右下角为G/G纯合子区(阴性对照的mP值分别为R110 38.0、TAMRA 42.0和R11039.0、TAMRA 52.0;阳性对照的mP值分别为R110 197.0、TAMRA 57.0和R110 198.0、TAMRA 66.0).

2.3 测序分析 含核心启动子区的PCR产物与pGEM® T-easy载体重组克隆扩增后,送上海基康公司测序,测序结果显示,TDI-FP检测的13例T<sub>1762</sub>-A<sub>1764</sub>突变型及1例T<sub>1762</sub>-A<sub>1764</sub>/A<sub>1762</sub>-G<sub>1764</sub>杂合型与测序结果完全吻合.2例TDI-FP检测为阴性的HBV DNA阳性组织在双突变位点前有8个核苷酸缺失突变,突变检测引物无法与模板结合,荧光素标记ddNTP无法加入而出现“假”阴性结果.如果在突变位点设计正向和反向引物,就可以提高检测的敏感性,避免“假”阴性的产生.20例肝细胞癌组织中,T<sub>1762</sub>-A<sub>1764</sub>突变型共15例,其频率为75%;T<sub>1762</sub>-A<sub>1764</sub>/A<sub>1762</sub>-G<sub>1764</sub>杂合型为5%;野生型为10%.

3 讨论

乙肝病毒是目前已知的可感染人体的最小的双链DNA病毒,他以其前基因组RNA(pregenomic RNA)为模板进行逆转录反应而复制<sup>[18]</sup>.HBV因复制过程的特殊性,他的自发突变率超过其他DNA病毒约4个数量级,在过去的10多年中,有关HBV突变临床意义的研究一直是热点之一<sup>[19]</sup>.近10a来,一些国家男性人群中肝细胞癌的发生呈上升趋势,在中国,自1990年以来,肝细胞癌已经成为第二位致死性癌症<sup>[20, 21]</sup>.肝细胞癌发生

中,HBV的感染是一个非常重要的病因<sup>[22-24]</sup>,并在流行病学、免疫病理学和分子病理学等方面得到证实<sup>[23,25]</sup>.但其致癌机制却不太清楚.许多学者通过研究HBV DNA和宿主细胞染色体DNA的整合情况,希望能找到有价值的线索,目前他们已从人、土拨鼠、地松鼠和鸭的肝细胞癌组织染色体DNA中发现整合有HBV DNA,但是这种整合是多发的和非特异的,而且常常出现病毒和宿主染色体DNA的缺失和重排.乙肝病毒核心启动子调控Pre-C RNA和C RNA的转录,有研究表明,慢性乙肝感染患者HBV DNA的核心启动子区常常出现A<sub>1762</sub> → T和G<sub>1764</sub> → A双突变<sup>[26,27]</sup>.在HBV感染高发的国家里,绝大多数的肝细胞癌发生于HBV携带者中,并且在肝细胞癌HBV DNA中,核心启动子发生双突变的频率非常高<sup>[28]</sup>.Edward Tabor et al发现江苏省启东县原发性肝细胞癌组织中85%有HBV T<sub>1762</sub>和A<sub>1764</sub>双突变序列,同样的突变序列在慢性乙肝病毒感染者(非肝癌患者)中仅为11%.HBV DNA核心启动子区出现T<sub>1762</sub>和A<sub>1764</sub>双突变,使核受体结合位点转换为肝细胞核转录因子-1(hepatocyte nuclear factor-1, HNF-1)的结合位点,并且特异性地抑制了Pre-C RNA的转录.双突变还使得与其重叠的X蛋白编码区的两个密码子发生改变.有研究证明,突变的X蛋白X(mt)和野生型X蛋白都有增强基因活化和加强HNF-1的DNA结合活性.而少量的X(mt)是基因活化和HNF-1 DNA结合活性所需要的<sup>[26]</sup>.X蛋白可激活HNF-1,使其从胞质转位到胞核,与其结合位点结合<sup>[29]</sup>.由于HBV复制增强,HBeAg表达降低,宿主的免疫清除能力减弱,导致宿主体内的HBV DNA有更多的机会整合到细胞染色体DNA上,他们随染色体的复制而复制,是细胞染色体DNA发生突变的机率增大,当达到一定程度时,就会导致肝细胞癌的发生.

本研究所采用的TDI-FP是TDI法(微测序(minisequencing),单核苷酸掺入法(single base incorporation),引物延伸法(primase extension))的进一步发展和完善,他以FP为检测手段的.当荧光素分子被平面偏振光激发时,他就在固定的平面发射出与其分子量成正比的偏振荧光(polarized fluorescence)<sup>[30,31]</sup>,这种现象称为荧光偏振(fluorescence polarization, FP).如果荧光素分子量较小,在溶液中自由旋转的速度较快,他会向各个方向发出发射光,荧光偏振不能保持.可是当荧光素分子量较大,旋转速度就会减慢,于是在特定时间内向同一方向发出发射光,荧光偏振就保持下来.荧光偏振作为一种检测工具可以用来分析蛋白-蛋白、蛋白-多肽、蛋白质-DNA和其他种类的分子间相互作用<sup>[32]</sup>.在单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism, SNP)分型方面,FP已经得到广泛应用<sup>[33]</sup>,如TDI-FP、FP-Taqman®和FP-Invader等.其中FP-TDI是最具前景的分析方法,在DNA聚合酶催化下,3'端紧临突变位点的引物加入一个与模板互补的荧光素标记的

ddNTP, 使得荧光素的分子量增大许多倍, 通过检测荧光素分子的 FP(单位为 mP), 可以知道加入的 ddNTP 的种类, 根据互补原理推断出突变位点核苷酸的类型.

TDI-FP 法的所有反应可以在同一个反应体系(如 MJ Research V2.0 384 微孔板)内分 4 步完成: (1) PCR 扩增含有突变位点的目的 DNA 片段; (2) 消化酶清除多余的引物和游离 dNTPs, 避免其干扰随后的引物延伸反应; (3) 加热失活消化酶; (4) 加入 DNA 聚合酶、检测突变引物和荧光素标记的 ddNTPs, 在热循环仪上进行引物延伸反应. 反应结束后, 把微孔板置于 FP 阅读仪上检测荧光素分子的 FP<sup>[30]</sup>. TID-FP 法具有以下优点: (1) 仅需要热循环仪和可以做 FP 检测的仪器, 这些都非常的便宜, 一般的实验室都可以承担; (2) 不需要特别修饰的引物和试剂, 花费较低<sup>[34-36]</sup>; (3) 该法非常容易优化; (4) FP-TDI 分析以 FP 作为检测手段, 后者与荧光强度无关, 因此不需要把游离的荧光素标记双脱氧核苷酸从体系中分离<sup>[30]</sup>.

由于 TDI-FP 法具有非常高的特异性和敏感性, 而且操作简便, 可以实现自动化和高通量检测, 在研究病原微生物基因突变、单核苷酸多态性、药物基因组学等方面具有广阔的应用前景.

#### 4 参考文献

- Kao JH, Wu NH, Chen PJ, Lai MY, Chen DS. Hepatitis B genotypes and the response to interferon therapy. *J Hepatol* 2000; 33:998-1002
- Yan JC, Chen WB, Ma Y, Liu JH, Sun XH, Xu CJ. The study of the vascular diseases tissue and immunohistochemistry of HBV infected liver tissue. *Shijie Huaren Xiaohua Zazhi* 2000;8:1205-1210
- Fang JN, Jin CJ, Cui LH, Quan ZY, Choi BY, Ki M, Park HB. A comparative study on serologic profiles of virus hepatitis B. *World J Gastroenterol* 2001;7:107-110
- Yan JC, Ma JY, Pan BR, Ma LS. The study of viral hepatitis B in China. *Shijie Huaren Xiaohua Zazhi* 2001;9:611-616
- He XS, Huang JF, Chen GH, Fu Q, Zhu XF, Lu MQ, Wang GD, Guan XD. Orthotopic liver transplantation for fulminant hepatitis B. *World J Gastroenterol* 2000;6:398-399
- Wu J, Cheng ML, Ding YS, Liu RC, Li J, Wang WL, Hu L. Five year following-up surver of risk factor of virus hepatic cirrhosis. *Shijie Huaren Xiaohua Zazhi* 2000;8:1365-1367
- Chen J. The molecular biochemistry study of pathogenesis of chronic viral hepatitis. *Shijie Huaren Xiaohua Zazhi* 2002;10:125-128
- Li RL, Xu DZ, Nie QH, Yan YP, Zhang JX. Role of hepatitis virus infection in pathogenesis of B-cell non-Hodgkin's lymphoma. *Shijie Huaren Xiaohua Zazhi* 2002;10:406-410
- Wang Y, Liu H, Zhou Q, Li X. Analysis of point mutation in site 1896 of HBV precore and its detection in the tissues and serum of HCC patients. *World J Gastroenterol* 2000;6:395-397
- Huang YX, Wu GH. The relationship between hepatitis B and hepatocellular carcinoma. *Shijie Huaren Xiaohua Zazhi* 2001;9:682-685
- Kreutz C. Molecular, immunological and clinical properties of mutated hepatitis B viruses. *J Cell Mol Med* 2002;6:113-143
- Yap SF, Wong PW, Chen YC, Rosmawati M. The frequency of pre-core gene mutations in chronic hepatitis B infection: a study of Malaysian subjects. *Southeast Asian J Trop Med Public Health* 2002;33:102-109
- Ogawa M, Hasegawa K, Naritomi T, Torii N, Hayashi N. Clinical features and viral sequences of various genotypes of hepatitis B virus compared among patients with acute hepatitis B. *Hepatol Res* 2002;23:167-177
- Hannoun C, Horal P, Lindh M. Long-term mutation rates in the hepatitis B virus genome. *J Gen Virol* 2000;81(Pt 1):75-83
- Ha-Lee YM, Lee J, Pyun H, Sohn J, Cho YJ, Kim Y. Sequence variations of hepatitis B virus promoter regions in persistently infected patients. *Arch Virol* 2001;146:279-292
- Grandjacques C, Pradat P, Stuyver L, Chevallier M, Chevallier P, Pichoud C, Maisonnas M, Treppe C, Zoulim F. Rapid detection of genotypes and mutations in the pre-core promoter and the pre-core region of hepatitis B virus genome: correlation with viral persistence and disease severity. *J Hepatol* 2000;33:430-439
- Akula N, Chen YS, Hennessy K, Schulze TG, Singh G, McMahon FJ. Utility and accuracy of template-directed dye-terminator incorporation with fluorescence-polarization detection for genotyping single nucleotide polymorphisms. *Biotechniques* 2002;32:1072-1076
- Bartholomeusz A, Locarnini S. Hepatitis B virus mutants and fulminant hepatitis B: fitness plus phenotype. *Hepatology* 2001; 34:432-435
- Lan L, Wang YM. The influence of the genetic heterogeneity of HBV on the Interferon responsibility. *Shijie Huaren Xiaohua Zazhi* 2002;10:696-698
- Tang ZY. Hepatocellular carcinoma-cause, treatment and metastasis. *World J Gastroenterol* 2001;7:445-454
- Shao XD, Wu KC, Guo XZ, Xu JH, Guo CC, Meng FP, Fan DM. Studies on expr ession of KAI1 gene in tissues of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. *Shijie Huaren Xiaohua Zazhi* 2001;9:1238-1241
- Chen WN, Oon CJ. Mutations and deletions in core promoter and precore stop codon in relation to viral replication and liver damage in Singaporean hepatitis B virus carriers. *Eur J Clin Invest* 2000;30:787-792
- Zhang WH, Zhu SN, Lu SL, Cong WM, Wu MC. HBV concomitant infection in HCV associated HCC. *Shijie Huaren Xiaohua Zazhi* 2000;8:175-177
- Reid AE, Liang TJ. Association of hepatitis C virus and hepatocellular carcinoma in the United States. *Princess Takamatsu Symp* 1995;25:41-49
- Lu YY, Li K, Cheng J, Wang L, Liu Y, Duan HJ, Zhang LX. Cloning and expression of hepatitis B virus X gene in yeast. *Shijie Huaren Xiaohua Zazhi* 2002;10:15-18
- Li J, Xu Z, Zheng Y, Johnson DL, Ou JH. Regulation of hepatocyte nuclear factor 1 activity by wild-type and mutant hepatitis B virus X proteins. *J Virol* 2002;76:5875-5881
- Lin CL, Liao LY, Liu CJ, Chen PJ, Lai MY, Kao JH, Chen DS. Hepatitis B genotypes and precore/basal core promoter mutants in HBeAg-negative chronic hepatitis B. *J Gastroenterol* 2002;37:283-287
- Lin X, Qian GS, Lu PX, Wu L, Wen YM. Full-length genomic analysis of hepatitis B virus isolates in a patient progressing from hepatitis to hepatocellular carcinoma. *J Med Virol* 2001; 64:299-304
- Guo SP, Wang WL, Zhai YQ, Zhao YL. Expression of nuclear factor-kappa B in hepatocellular carcinoma and its relation with the X protein of hepatitis B virus. *World J Gastroenterol* 2001;7:340-344
- Kwok PY. SNP genotyping with fluorescence polarization detection. *Hum Mutat* 2002;19:315-323
- Hsu TM, Chen X, Duan S, Miller RD, Kwok PY. Universal SNP genotyping assay with fluorescence polarization detection. *Biotechniques* 2001;31:560-568
- Tencza SB, Islam KR, Kalia V, Nasir MS, Jolley ME, Montelaro RC. Development of a fluorescence polarization-based diagnostic assay for equine infectious anemia virus. *J Clin Microbiol* 2000;38:1854-1859
- Kricka LJ. Stains, labels and detection strategies for nucleic acids assays. *Ann Clin Biochem* 2002;39(Pt 2):114-129
- Kwok PY. Methods for genotyping single nucleotide polymorphisms. *Annu Rev Genomics Hum Genet* 2001;2:235-258
- Nielsen K, Gall D. Fluorescence polarization assay for the diagnosis of brucellosis: a review. *J Immunoassay Immunochem* 2001; 22:183-201
- Brennan MD. High throughput genotyping technologies for pharmacogenomics. *Am J Pharmacog* 2001;1:295-302



Published by **Baishideng Publishing Group Inc**  
7901 Stoneridge Drive, Suite 501, Pleasanton,  
CA 94588, USA  
Fax: +1-925-223-8242  
Telephone: +1-925-223-8243  
E-mail: [bpgoffice@wjgnet.com](mailto:bpgoffice@wjgnet.com)  
<http://www.wjgnet.com>



ISSN 1009-3079

