

• 研究快报 •

乙型肝炎病毒前-S蛋白在大肠杆菌中的表达和纯化

王春花,成军,郎振为,李蕴茹,闫杰,张黎颖

王春花,成军,李蕴茹,闫杰,张黎颖,北京地坛医院传染病研究所
北京市 100011
郎振为,北京地坛医院病理科 北京市 100011
国家自然科学基金攻关项目, No. C03011402, No. C30070689
军队“九、五”科技攻关项目, No. 98D063
军队回国留学人员启动基金项目, No. 98H038
军队“十、五”科技攻关青年基金项目, No. 01Q138
军队“十、五”科技攻关面上项目, No. 01MB135
通讯作者:成军, 100011, 北京市东城区安定门外大街地坛公园13号, 北京
地坛医院传染病研究所. cji@genetherapy.com.cn
电话: 010-64481639 传真: 010-64281540
收稿日期: 2005-01-10 接受日期: 2005-05-25

摘要

目的: 在大肠杆菌中表达乙型肝炎病毒(HBV)前-S蛋白, 并进行纯化和鉴定.

方法: 通过聚合酶链式反应(PCR)获得HBV前-S基因, 将前-S克隆至PET32a+, 构建原核表达重组质粒, 在大肠杆菌中诱导表达, 表达产物进行SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE), 考马斯亮蓝染色. 采用凝胶电泳回收纯化. 经Western blot.

结果: 成功扩增获得HBV的前-S编码基因片段, 并构建大肠杆菌表达载体. 表达载体转化的大肠杆菌经过IPTG的诱导, 裂解, SDS-PAGE, 结果显示得到了目的蛋白Mr28 000. 以抗-His的单克隆抗体进行的western blot杂交实验, 结果表明表达、纯化的目的蛋白具有特异性免疫反应识别.

结论: 成功表达HBV的前-S蛋白, 对于研究HBV的前-S蛋白的免疫原性和生物学特性奠定了坚实的基础.

王春花,成军,郎振为,李蕴茹,闫杰,张黎颖. 乙型肝炎病毒前-S蛋白在大肠杆菌中的表达和纯化. 世界华人消化杂志 2005;13(15):1894-1896
<http://www.wjgnet.com/1009-3079/13/1894.asp>

0 引言

乙型肝炎病毒(HBV)是一种嗜肝部分双链DNA病毒, 不仅引起急、慢性病毒性肝炎, 而且与肝纤维化(LF)、肝细胞癌(HCC)的发生、发展密切相关^[1]. 1979年Geibert *et al*首次报告了HBV DNA的全基因序列, 并确定了4个主要的开放读码框架(ORF)^[2-3]. HBV基因组只有3.2 kb, 其结构特点是结构基因与调节基因序列之间重叠, 甚至结构基因序列之间重叠, HBV DNA序列的利用率之高实属罕见^[4-12]. 最近我们课题组对中国HBV流行株的全基因序列进行克隆和序列分析, 提出了HBV DNA编码基因序列中存在一个新的ORF前-S基因序列的理论^[13-14], 并重新确定了S区启动子的位置, 提出全S基因在HBV基

因组中的新位置, 在国内外引起广泛关注, 但是该理论的研究工作目前只是初步在基因水平证实前-S基因序列的真实存在, 特别是关于前-S基因具有完整的ORF的编码蛋白序列的理论主要是建立在生物信息学的应用分析之上, 如果能从蛋白水平在临床实验资料中进一步验证前-S是一种编码蛋白, 那么对前-S编码基因的真实性将更有说服力.

由于前-S编码蛋白是一种新型的功能未知的蛋白, 不存在商品化的检测试剂盒, 为了制备抗体用于临床标本的检测, 我们自己尝试在原核系统中进行表达, 获得了大量高效表达的重组抗原, 通过Western blot杂交实验证实, 具有良好的免疫原性, 为下一步免疫动物制备多克隆抗体应用于免疫组织化学和酶联免疫吸附的检测奠定了实验基础.

1 材料和方法

1.1 材料 质粒和菌株:pMD-18T载体购自Takara, 表达载体pET32a+和大肠杆菌 *E. coli* BL21、*E. coli* XL1均为本室保存; pcDNA3.1(-)-前-S由本室构建. 主要试剂: IPTG购自Promega公司, 高保真PCR系统(Elongase mix enzyme)购自Invitrogen公司, 小量质粒抽提及胶纯化回收试剂盒购自QIAGEN公司, T4DNA连接酶及限制性内切酶均购自Takara公司, 其余化学试剂均为国产分析纯和生化试剂. DNA序列测定由上海博亚公司完成.

1.2 方法

1.2.1 前-S的PCR扩增 根据报道的前-S蛋白基因序列^[13], 设计序列特异性引物P1、P2, P1:GGATC CATGAGTTAACATTAC, P2:AAGCTTGCTGTAGCTCT GTTCC, 在P1-5'端含有BamHI酶切位点, P2-5'端含有Hind III酶切位点. 利用pcDNA3.1(-)-前-S为模板, PCR技术扩增获得该新基因的全长序列.

1.2.2 重组表达质粒的构建 将纯化的目的基因连接至pMD-18T载体, 经测序确定序列后, 用BamHI和Hind III从克隆载体酶切目的基因片段, 琼脂糖凝胶电泳纯化, 与经BamHI和Hind III酶切pET32a+表达质粒连接, 转化大肠杆菌 *E. coli* XL1, 小量提取质粒酶切鉴定.

1.2.3 重组蛋白的表达和包涵体纯化 将鉴定为阳性的质粒转化大肠杆菌 *E. coli* BL21, 挑取单菌落, 37℃振摇培养12 h, 以1:5稀释, 37℃振摇培养2 h, 加入IPTG至终浓度1 mmol/L. 同时设阴性对照, 继续37℃振摇培养4 h. 对经120 g/L SDS-PAGE电泳证实的表达菌株, 进行大量诱导, 超声裂解破碎, 分别收集裂解上清和沉

淀，将沉淀用包涵体洗液清洗一次，溶于8 mol/L 尿素(PH8.0)中，采用凝胶电泳回收的方法进行纯化。

1.2.4 重组蛋白的抗原性检测 Western blot 检测：以 His 抗体 1:3 000 稀释作为第一结合抗体，第二结合抗体为兔抗鼠 IgG，由中山公司生产，以 1:5 000 稀释。

2 结果

2.1 新基因前-前-S的序列分析结果 应用PCR技术扩增得到了前-前-S的序列，乙型肝炎病毒前-前-S基因含 135 nt，编码产物为 45 aa(图 1)。

```

ATG CAG TTA ATC ATT ACT TCC AAA CTA GGC ATT ATT TAC ATA CTC TGT GGA
M Q L I I T S K L G I I Y I L C G
AGG CTG GCA TTC TAT ATA AGA GAG AAA CTA CAC GCA GCG CCT CAT TTT GTG
R L A F Y I R E K L H A A P H F G
GGT CAC CAT ATT CTT GGG AAC AAG AGC TAC AGC
V H H I L G N K S Y S

```

图1 乙型肝炎病毒前-前-S基因及其编码产物序列。

2.2 重组前-前-S蛋白的表达、纯化及免疫学检测分析 将重组阳性质粒转入大肠杆菌 *E. coli* BL21，经 IPTG 诱导得到表达。表达产物进行 SDS-PAGE(120 g/L)，考马斯亮蓝染色。结果表明其表达产物主要以包涵体形式存在，*M* 28 000，纯化后的包涵体未显示其他杂带(图 2)。蛋白印迹试验表明，表达的重组蛋白与 His 抗体可产生特异性结合，在 *M* 28 000 左右有明显杂交信号(图 3)。

3 讨论

1979 年，Gelibert *et al* 首次报告了 HBV 基因组的全序列，并定位了 4 个 ORF。我国学者于 1984 年报道了大陆 HBV 株(*adr*)的序列^[15]。目前在美国国立卫生研究院(NIH)的核苷酸序列数据库(GenBank)中，存储了 200 多个 HBV 全基因组序列，但之后学者对 4 个 ORF 分区的界定并无异议，沿用至今。前-前-S 区 ORF 在 1983 年 Fujiyama *et al*^[16] 克隆的 *adr* 亚型的 S 基因产物中最早被提及，作者认为存在一身份不明的 ORF(unidentified reading




图2 前前S融合蛋白的 SDS-PAGE 凝胶电泳分析。M: Marker; 1: 纯化的包涵体；2: 包涵体洗液；3: 包涵体；4: 诱导的前前S融合蛋白裂解液；5: 未诱导的前前S融合蛋白裂解液。

frame)；而 Mimms *et al*^[17] 将 Fujiyama *et al* 报告的克隆(S43492)进行再分析后，认为该段多肽位于前-S1 多肽内部，他们认为的前-S1 长度为 164 aa，而不是通常认为的 119 aa 或 108 aa。我们课题组利用 LA-PCR 技术扩增了中国 HBV 流行株 DNA 全基因序列，在分析所获得的 5 个克隆的过程中，发现在前-S1 区之前还存在一个 ORF，长度 135 bp，编码 45 aa，命名为前-前-S 区。与初期选择的 GenBank 中 6 个其他血清型的 HBV 克隆株进行比较，其中 3 个克隆具有前-前-S 区 ORF。应用 DNASIS 软件的蛋白分析功能分析了前-前-S、前-S1、前-S2 和 S 基因的完全表达产物，前-前-S 区较以往认为的大蛋白多出一个小的疏水区。其中的 19(21) 个疏水氨基酸在前-前-S 区形成了一个小的疏水功能域，可能与蛋白的空间折叠或表面蛋白合成后分泌有关。前-前-S 多肽推断氨基酸序列中含有 6 个亮氨酸(L)，分别位于第 3、9、15、19、27、39 位，前 3 个 L 是否可形成亮氨酸拉链结构，尚需要进一步证实^[13-14]。

目前多种资料的研究结果证明前-前-S 区至少在基因水平是存在的，以往研究认为该区的编码并不是一种普遍现象，因而未加以重视^[18-25]。我们课题组的实验结果显示具有前-前-S 区的 HBV 克隆株多来自日本和中国，欧美学者在最初的研究中获得的样本存在一定的偏差，这可能是忽视该区域的原因之一。另外，由于目前仍缺乏对 HBV 的大规模分子流行病学资料，因而早期发现前-前-S 区的学者可能认为一些位点发生变异，而不认为这是一种主流现象，但通过对其他学者获得的克隆进行分析也发现了前-前-S 区，应当认为前-前-S 区的存在不是一种个别现象，至少在中国和日本是非常常见的^[26-30]。

从蛋白水平和临床资料中证实前-前-S 是一种编码蛋白，是支持该理论的关键点所在，由于前-前-S 编码蛋白是一种新型的功能未知的蛋白，不存在商品化的检测试剂盒，因而表达纯化前-前-S 编码蛋白制备多克隆抗体应用于临床检测是必经之路。大肠杆菌作为目前应用最广泛的原核表达系统，表达目的蛋白具有快速、高效、经济等很多优点^[31]。pET32a+ 含有一段辅助蛋白基因，该辅助蛋白包括 Trx, His, S 等标签序列，有助于提高目的




图3 前前S融合蛋白的蛋白印迹实验。M: Marker; 1: 未诱导的前前S融合蛋白裂解液；2: 诱导的前前S融合蛋白裂解液。

蛋白的表达效率，即对表达产物进行纯化和检测，其M_r 18 000~20 000，在大多数情况下不会影响被修饰蛋白的免疫原性、结构和功能。由此，我们选用 pET32a+作为表达载体，并且上游引物中碱基的设计与载体相匹配，表达蛋白时使辅助蛋白融合到目的蛋白的N端。应用此设计，在大肠杆菌中获得了高效表达的融合蛋白，表达蛋白以包涵体形式存在。SDS-PAGE电泳显示融合辅助蛋白的表达产物M_r 28 000，这与预测的前前S蛋白大小相吻合，并且通过WB检测证实此融合蛋白包含His组氨酸标签，从而间接证实了前-前-S的表达。外源蛋白高水平表达过程中容易形成无活性的包涵体^[32]，这是原核表达系统的一个缺陷，但以包涵体形式表达的蛋白容易纯化，且保留免疫原性，可不经复性作为检测抗体诊断试剂盒的包被抗原。因不考虑复性，所以将包涵体经高浓度尿素溶解后，采用从已染色的凝胶中电洗脱法纯化回收目的蛋白。这种方法既可确保蛋白纯度，又相对简便、经济。

本研究从基因水平已证实前-前-S区存在前提下，成功构建了前-前-S的原核表达载体，在大肠杆菌中表达纯化了具有免疫原性的前-前-S蛋白，为下一步制备多抗奠定了实验基础，为下游的临床检测提供了将基础实验研究与临床验证相结合的桥梁，并且前-前-S蛋白的功能如果得到进一步证实，也将对HBV感染的检测、疫苗设计、HBV进入肝细胞机制(受体学说)、表面抗原的表达过程及功能、宿主抗感染机制、HCC产生机制研究均产生重大影响。

4 参考文献

- 1 成军, 杨守纯. 现代肝炎病毒分子生物学. 第1版. 北京: 人民军医出版社, 1997:179-182
- 2 Gelibert F, Mandart E, Fitoussi F, Tiollais P, Charnay P. Nucleotide sequence of the hepatitis B virus genome (subtype ayw) cloned in *E. coli*. *Nature* 1979;281:646-650
- 3 Charnay P, Mandart E, Hampe A, Fitoussi F, Tiollais P, Galibert F. Localization on the viral genome and nucleotide sequence of the gene coding for the two major polypeptides of the hepatitis B surface antigen (HBsAg). *Nucleic Acids Res* 1979;7:335-346
- 4 靳青, 成军, 王勤环, 皇甫竞坤, 施双双, 张国庆, 洪源, 李莉, 斯崇文. 乙型肝炎病毒DNA序列异质性及准种特点的研究. 中华医学杂志 2002;82:81-85
- 5 靳青, 成军, 王勤环, 施双双, 皇甫竞坤, 王刚, 洪源, 李莉, 斯崇文. 乙型肝炎病毒前C/C基因准种与变异特点的研究. 解放军医学杂志 2002;27:122-123
- 6 靳青, 成军, 王勤环, 王刚, 施双双, 刘丽, 夏小兵, 李莉, 张国庆, 斯崇文. 乙型肝炎病毒C基因启动子区准种与变异特点的研究. 中华实验和临床病毒学杂志 2002;16:264-266
- 7 靳青, 施双双, 皇甫竞坤, 成军, 王勤环, 李莉, 斯崇文. 乙型肝炎病毒X基因准种特点的研究. 中国病毒学 2002;17:22-26
- 8 成军. 乙型肝炎病毒基因异质性及准种特点研究的临床意义. 解放军医学杂志 2002;27:112-115
- 9 靳青, 李进, 施双双, 皇甫竞坤, 成军, 王勤环, 洪源, 工业东, 李莉, 斯崇文. 乙型肝炎病毒基因准种与变异特点的研究. 解放军医学杂志 2002;27:116-118
- 10 靳青, 成军, 皇甫竞坤, 洪源, 王刚, 陈国凤, 李莉, 张玲霞, 陈菊梅. 乙型肝炎病毒序列个体化变异的初步观察. 解放军医学杂志 2002;27:119-121
- 11 刘丽, 靳青, 皇甫竞坤, 成军, 王刚, 王琳, 李莉. 乙型肝炎病毒X基因异质性及其对反式激活功能的影响. 解放军医学杂志 2002;27:125-127
- 12 刘丽, 靳青, 皇甫竞坤, 成军, 韩萍, 牟劲松, 李克, 钟彦伟. 乙型肝炎病毒核心启动子区基因异质性及对其转录活性的影响. 解放军医学杂志 2002;27:128-130
- 13 靳青, 成军. 乙型肝炎病毒基因前-X编码基因的界定. 世界华人消化杂志 2003;11:1097-1101
- 14 杨倩, 靳青, 成军, 刘丽, 洪源, 王建军, 张树林. 乙型肝炎病毒基因前-I前-S-S-编码基因启动子序列的确定及转录活性的鉴定. 解放军医学杂志 2003;28:762-764
- 15 付人宝, 储美莲, 沈绿萍, 钱苏雯, 李载平. 克隆的adr型乙型肝炎病毒(pADR-1)的核苷酸顺序. 中国科学B辑 1986;5:55-65
- 16 Fujiyama A, Miyanohara A, Nozaki C, Yoneyama T, Ohtomo N, Matsubara K. Cloning and structural analyses of hepatitis B virus DNAs, subtype adr. *Nucleic Acids Res* 1983;11:4601-4610
- 17 Mimms LT, Solomon LR, Ebert JW, Fields H. Unique preS sequence in a gibbon-derived hepatitis B virus variant. *Biochem Biophys Res Commun* 1993;195:186-191
- 18 靳青, 成军, 王勤环, 刘丽, 王刚, 施双双, 夏小兵, 李克, 邵得志, 斯崇文. 乙型肝炎病毒囊膜中蛋白与白细胞介素-18联合基因免疫的实验研究. 中华传染病杂志 2002;20:148-151
- 19 Lu YY, Li K, Cheng J, Wang L, Liu Y, Zhang LX. Cloning and expression of pre-S1 gene of hepatitis B virus in yeast. *Hepatobiliary Pancreatic Dis Int* 2002;1:238-242
- 20 刘丽, 成军, 张跃新, 段惠娟, 牟劲松, 韩萍, 李莉, 张玲霞, 陈菊梅. 截短型HBsAg中蛋白反式激活基因的克隆. 中华传染病杂志 2002;20:218-221
- 21 靳青, 施双双, 张国庆, 皇甫竞坤, 成军, 王勤环, 李莉. 乙型肝炎病毒表面抗原/抗体同时阳性患者体内S基因序列的分析研究. 中国公共卫生 2002;18:535-537
- 22 靳青, 刘丽, 皇甫竞坤, 施双双, 王刚, 洪源, 陈国凤, 李莉, 陈菊梅, 成军. 乙型肝炎病毒表面抗原基因多态性的初步研究. 胃肠病学和肛肠病学杂志 2002;11:130-135
- 23 靳青, 成军, 王勤环, 施双双, 洪源, 郎振华, 皇甫竞坤, 李莉, 斯崇文. HBsAg中蛋白与IL-18联合核酸免疫HBsAg转基因小鼠的实验研究. 中华微生物与免疫学杂志 2002;22:518-519
- 24 刘丽, 成军, 王刚, 李克, 段惠娟, 王琳, 李莉, 张玲霞, 陈菊梅. HCV核心蛋白与截短型HBV表面抗原中蛋白协同反式激活功能的研究. 中华肝脏病杂志 2002;10:354-357
- 25 Deng H, Dong J, Cheng J, Huangfu JK, Shi SS, Hong Y, Ren XM, Li L. Quasispecies groups in the core promoter region of hepatitis B virus. *Hepatobiliary Pancreatic Dis Int* 2002;1:392-396
- 26 陆荫英, 李克, 王琳, 刘丽, 工业东, 成军, 张玲霞. 乙型肝炎病毒前-S2蛋白结合蛋白的筛选. 中华肝脏病杂志 2003;11:8-10
- 27 陆荫英, 王琳, 刘丽, 李克, 成军, 张玲霞, 李莉. 乙型肝炎病毒核心抗原与金属硫蛋白相互作用的研究. 解放军医学杂志 2003;28:161-163
- 28 刘丽, 成军, 陆荫英, 王刚, 牟劲松, 李莉, 张玲霞, 陈菊梅. 乙型肝炎病毒X蛋白反式调节基因的克隆化研究. 中华肝脏病杂志 2003;11:5-7
- 29 刘丽, 成军, 邵得志, 王琳, 钟彦伟, 靳青, 李克, 李莉. HCV核心蛋白与HBV X蛋白协同反式激活作用的研究. 中华实验和临床病毒学杂志 2003;17:39-41
- 30 陆荫英, 王琳, 刘丽, 李克, 成军, 张玲霞, 李莉. 乙型肝炎病毒e抗原与金属硫蛋白相互作用的研究. 解放军医学杂志 2003;28:451-453
- 31 Swartz JR. Advances in escherichia coli production of therapeutic proteins. *Curr Opin Biotechnol* 2001;12:195-201
- 32 Krefhaber T, Rudolph R, Kohler HH. Protein aggregation in vitro and vivo:a quantitative model of the kinetic competition between folding and aggregation. *Bio Technol* 1991;9:825-829