

# 雷公藤内酯醇对5-LOX代谢通路和胰腺癌细胞凋亡的影响

丁晓凌, 周国雄, 周晓荣, 汪晓莺

丁晓凌, 周国雄, 南通大学附属医院消化内科 江苏省南通市 226001

周晓荣, 汪晓莺, 南通大学医学院免疫研究室 江苏省南通市 226001

丁晓凌, 2004级南通大学附属医院消化内科硕士, 主治医师, 讲师, 主要从事胰腺癌研究。

江苏省自然科学基金资助项目, No. BK2004049

**作者贡献分布:** 此课题由周国雄与丁晓凌设计; 研究过程由丁晓凌操作完成; 研究所用新试剂及分析工具由周晓荣与汪晓莺提供; 数据分析由丁晓凌与周晓荣完成; 本论文写作由丁晓凌, 周国雄及周晓荣完成。

**通讯作者:** 周国雄, 226001, 江苏省南通市西寺路20号, 南通大学附属医院消化内科. guoxiong\_zhou@163.com

电话: 0513-85112816

收稿日期: 2008-09-27 修回日期: 2008-10-21

接受日期: 2008-10-27 在线出版日期: 2008-12-08

## Triptolide suppresses 5-lipoxygenase metabolic pathway and induces apoptosis in pancreatic tumor cell lines

Xiao-Ling Ding, Guo-Xiong Zhou, Xiao-Rong Zhou, Xiao-Ying Wang

Xiao-Ling Ding, Guo-Xiong Zhou, Department of Gastroenterology, the Affiliated Hospital of Nantong University, Nantong 226001, Jiangsu Province, China

Xiao-Rong Zhou, Xiao-Ying Wang, Department of Immunology, Medical College of Nantong University, Nantong 226001, Jiangsu Province, China

Supported by: the Natural Science Foundation of Jiangsu Province, No. BK2004049

Correspondence to: Guo-Xiong Zhou, Department of Gastroenterology, the Affiliated Hospital of Nantong University, 20 Xisi Road, Nantong 226001, Jiangsu Province, China. guoxiong\_zhou@163.com

Received: 2008-09-27 Revised: 2008-10-21

Accepted: 2008-10-27 Published online: 2008-12-08

## Abstract

**AIM:** To investigate the effects and the mechanism of triptolide (TL) on proliferation and apoptosis of pancreatic cancer *in vitro*.

**METHODS:** Pancreatic tumor cell lines PANC-1, ASPC-1 and SW1990 were treated with different concentrations of TL for 24 h and then, cell death was determined by Typan Blue Staining. Annexin V/PI double staining was performed to evaluate TL-induced apoptosis using flow cytometry. The expression of 5-lipoxygenase (5-LOX) and concentration of its downstream product LTB<sub>4</sub>

were determined by real time PCR, Western blot and ELISA. 5-LOX cDNA stable transfected SW1990 cells were established successfully. After treatment with TL, it was examined for over-expression of 5-LOX on TL-induced apoptosis.

**RESULTS:** TL induced prominent growth inhibition and apoptosis in human pancreatic cancer cell lines. After treatment at 50 µg/L, the cell viability was 70.5% ± 6.8%, 61.2% ± 5.6% and 52.8% ± 5.3% of PANC-1, ASPC-1 and SW1990, respectively, which were significantly decreased compared with control group ( $P < 0.05$ ). The apoptosis at 12 h evaluated by AnnexinV positive cells increased in TL-treated group compared with control group ( $24.2 \pm 3.23$  vs  $9.5 \pm 2.18$ ,  $P < 0.05$ ). TL significantly down-regulated 5-LOX expression in these cell lines and decreased LTB<sub>4</sub> concentration in supernatant ( $P < 0.01$ , compared with control group). Furthermore, overexpression of 5-LOX in SW1990 cells made them more resistant to TL induced apoptosis, significantly inhibited the TL mediated cell death and apoptosis ( $P < 0.01$  or  $0.05$ , compared with control group).

**CONCLUSION:** Inhibition of 5-LOX pathway of arachidonic acid metabolism is associated with TL's anti-proliferation and pro-apoptotic activity. It also provides evidence that TL has clinic therapeutic value for patients with pancreatic cancer.

**Key Words:** Pancreatic cancer; Triptolide; 5-lipoxygenase

Ding XL, Zhou GX, Zhou XR, Wang XY. Triptolide suppresses 5-lipoxygenase metabolic pathway and induces apoptosis in pancreatic tumor cell lines. *Shijie Huaren Xiaohua Zazhi* 2008; 16(34): 3835-3839

## 摘要

**目的:** 探讨雷公藤内酯醇(triptolide, TL)通过抑制5-脂氧合酶(5-lipoxygenase, 5-LOX)代谢通路对胰腺癌细胞生长增殖及凋亡的影响。

**方法:** 台盼蓝染色检测TL对胰腺癌细胞

## ■背景资料

胰腺癌恶性度高, 预后差, 目前研究热点包括阐明胰腺癌发病的分子机制, 寻找早期诊断方法和开发新的治疗途径。

## ■同行评议者

李淑德, 主任医师, 中国人民解放军第二军医大学长海医院消化内科

## ■相关报道

近年来研究发现, TL可抑制多种肿瘤细胞增殖、诱导细胞凋亡, 但分子机制仍不清楚。在胰腺癌发病机制方面, 发现胰腺癌细胞高表达5-LOX, 而抑制5-LOX代谢通路能诱导胰腺癌细胞凋亡。

PANC-1、ASPC-1和SW1990的杀伤作用; 流式细胞术分析凋亡率; Real-time PCR和Western blot检测TL对5-LOX表达的影响; ELISA检测5-LOX下游产物LTB<sub>4</sub>的含量。构建5-LOX表达质粒, 筛选稳定转染的SW1990细胞株(SW1990/5-LOX), Western blot检测野生型、转染空质粒、转染5-LOX基因的SW1990细胞5-LOX蛋白表达水平, 并检测胰腺癌细胞高表达5-LOX对TL诱导凋亡的影响。

**结果:** TL能诱导胰腺癌细胞凋亡, TL 50  $\mu\text{g/L}$ 作用24 h后活细胞比例为PANC-1 70.5% $\pm$ 6.8%, ASPC-1 61.2% $\pm$ 5.6%, SW1990 52.8% $\pm$ 5.3%, 比对照组显著减少( $P<0.05$ ); 凋亡细胞数12 h组与对照组相比, 有差异( $24.2\pm 3.23$  vs  $9.5\pm 2.18$ ,  $P<0.05$ )。TL能显著抑制5-LOX表达及LTB<sub>4</sub>生成。稳定转染后, 细胞内5-LOX蛋白表达量是Wt组的4倍左右, 培养上清中LTB<sub>4</sub>表达水平也显著高于Wt组( $P<0.01$ )。过表达5-LOX使SW1990细胞增强了对TL诱导凋亡的抵抗作用, 细胞死亡和凋亡率均明显低于对照组( $P<0.01$ 或 $0.05$ )。

**结论:** TL可以在体外诱导胰腺癌细胞增殖抑制和细胞凋亡, 该效应与TL抑制5-LOX代谢通路的活性可能有直接关系, 提示TL可能开发成临床治疗胰腺癌的有效药物。

**关键词:** 胰腺癌; 雷公藤内酯醇; 5-脂氧合酶

丁晓凌, 周国雄, 周晓荣, 汪晓莺. 雷公藤内酯醇对5-LOX代谢通路和胰腺癌细胞凋亡的影响. 世界华人消化杂志 2008; 16(34): 3835-3839  
<http://www.wjgnet.com/1009-3079/16/3835.asp>

## 0 引言

胰腺癌是常见的恶性肿瘤之一, 5年生存率小于2%<sup>[1-2]</sup>, 确诊时多已属晚期, 丧失了根治性手术的机会。因此, 深入探讨发病机制, 寻找新的诊治手段是当前胰腺癌研究的热点。流行病学资料 and 动物研究表明高脂饮食, 特别是花生四烯酸(arachidonic acid, AA)和亚油酸等多不饱和脂肪酸的摄入增加与胰腺癌关系密切<sup>[3-4]</sup>。5-脂氧合酶(5-lipoxygenase, 5-LOX)是催化AA转化为白三烯(leukotriene, LT)和5-羟基二十碳四烯酸(5-HETE)的关键酶。近年来有文献报道在胰腺癌组织中有5-LOX上调, 而且5-LOX阻断剂能够在体外抑制肿瘤细胞增殖, 并诱导细胞凋亡<sup>[5]</sup>, 提示干预5-LOX途径可能具有潜在的临床治疗胰腺癌的价值。雷公藤内酯醇(triptolide, TL)是

从卫矛科植物雷公藤中抽提到的三氧二萜内酯化合物单体, 具有显著的抗炎、免疫抑制作用<sup>[6]</sup>。有资料表明, TL可抑制乳腺癌、前列腺癌、肺癌等多种肿瘤细胞增殖、诱导细胞凋亡<sup>[7-9]</sup>。我们研究了TL在体外对胰腺癌细胞增殖及凋亡的影响, 并探讨其抗肿瘤效应与抑制5-LOX代谢途径的关系。

## 1 材料和方法

**1.1 材料** TL购自福建医学科学研究所, 人胰腺癌细胞株SW1990细胞由上海交通大学附属第一人民医院消化内科王兴鹏教授惠赠。人胰腺癌细胞株ASPC-1购自上海中科院细胞库。人胰腺癌细胞株PANC-1由上海市免疫学研究所周芸惠赠。细胞在含100 mL/L胎牛血清的DMEM培养液常规培养, 于对数生长期时加入含TL的培养液作为处理组, 对照组加入含0.01% DMSO培养液。

### 1.2 方法

**1.2.1 细胞增殖与凋亡检测:** 台盼蓝染色检测TL对细胞增殖抑制作用。细胞培养对数期加入50  $\mu\text{g/L}$  TL处理细胞, 收集细胞, 凋亡检测采用BD公司提供的ApoAlert Annexin-V kit,  $2\times 10^5$ 细胞用PBS洗1次, 加入200  $\mu\text{L}$ 结合溶液并悬浮细胞, 再加5  $\mu\text{L}$  Annexin V和5  $\mu\text{L}$  PI置于室温避光15 min, 上流式细胞仪检测, Annexin V阳性代表凋亡细胞。

**1.2.2 Real-time PCR:** TRIzol提取总RNA, 逆转录定量PCR试剂盒购自TaKaRa公司,  $\Delta\Delta\text{Ct}$ 法对结果进行分析<sup>[10]</sup>。引物序列如下: 5-LOX上游引物 5'-ACCACGGAGATGGTAGAGTGCAG-3', 下游引物 5'-GCAGCTCAAAGTCCACGATGAA-3';  $\beta$ -actin上游引物5'-ATTGCCGACAGGATGCAG A-3', 下游引物 5'-GAGTACTTGCGCTCAGGA GGA-3'。

**1.2.3 质粒构建和转染:** 从SW1990细胞克隆5-LOX的cDNA, 合成上游引物5'-CGCCATGCC CTCCTACACGGTCAC-3'和下游引物5'-CTGCT CGAGTGCTCAGATGGCCACACTGTT-3', 下游引物含Xho I 内切酶识别位点, PCR条件: 94 $^{\circ}\text{C}$  4 min, 94 $^{\circ}\text{C}$  1 min, 58 $^{\circ}\text{C}$  1 min, 72 $^{\circ}\text{C}$  4 min, 28个循环后72 $^{\circ}\text{C}$  10 min中止。将5-LOX基因克隆到pGEMT-easy(Promega)载体中, 测序确认, 用EcoR和Xho I 双酶切, 将5-LOX cDNA插入表达质粒pcDNA3.1中(pcDNA3.1/5-LOX), 细胞转染用FuGENE 6转染试剂(Roche), 同时设pcDNA3.1空质粒转染组。用1 g/L G418(Calbiochem)筛选稳定

转染的细胞株, 并以500 mg/L G418维持培养.

1.2.4 ELISA检测LTB<sub>4</sub>含量: 检测试剂盒购自R&D公司, 按说明书操作.

1.2.5 Western blot检测: 提取总蛋白, 100 g/L聚丙烯酰胺凝胶电泳, 转PVDF膜, 含50 g/L脱脂奶粉的TBS封闭, 1:1000加入抗5-LOX一抗(Cayman), 4℃过夜, 1:5000加入HRP标记二抗, 作用2 h, ECL显色, 曝光洗片.

**统计学处理** 采用STATA 7.0统计软件分析, 数据以mean±SD表示, 两组计量资料用 $t$ 检验; 多组计量资料用单因素方差分析.  $P<0.05$ 为显著性判断水准.

## 2 结果

2.1 TL抑制胰腺癌细胞增殖并诱导细胞凋亡 用10、50、100 μg/L的TL处理PANC-1、ASPC-1和SW1990细胞, 台盼兰试验可以检测到显著的细胞死亡. 如图1所示, 50 μg/L TL可以导致明显的细胞死亡, 24 h后活细胞比例为PANC-1 70.5%±6.8%, ASPC-1 61.2%±5.6%, SW1990 52.8%±5.3%, 比对照组(>95%)及10 μg/L组显著减少( $P<0.05$ ).

为了检测TL是否能诱导胰腺癌细胞凋亡, 我们用50 μg/L TL作用SW1990细胞0-24 h, Annexin V/PI双染法流式细胞仪检测细胞凋亡率. 结果发现50 μg/L TL可使大量SW1990细胞凋亡, 表现为Annexin V阳性细胞数明显增加, 12 h组与对照组相比( $24.2\pm3.23$  vs  $9.5\pm2.18$ ,  $P<0.05$ ). 图2为其中一次实验结果. 可见, TL对胰腺癌细胞株的杀伤作用与其诱导凋亡有关.

2.2 TL抑制胰腺癌细胞5-LOX表达以及LTB<sub>4</sub>的产生 Western blot检测到在PANC-1、ASPC-1和SW1990细胞株中均有5-LOX蛋白的表达(图3A). 用50 μg/L TL处理细胞, Real time PCR检测5-LOX基因的表达. 结果发现, TL可以显著抑制PANC-1、ASPC-1和SW1990细胞5-LOX mRNA表达(图3B), 图中倍率变化(fold)表示TL处理后与处理前5-LOX mRNA比值(以β-actin为内参校准). 这种抑制作用在TL处理后2 h就可以观察到, 12 h后更加明显, 提示5-LOX可能是TL的靶基因.

进一步, 我们用50 μg/L TL处理SW1990细胞, Western blot检测细胞中5-LOX蛋白表达情况. 结果发现, TL可以显著抑制SW1990细胞5-LOX蛋白表达(图4A). ELISA检测证实不同浓度的TL作用SW1990细胞6 h后, 上清中5-LOX的




图1 TL对胰腺癌细胞PANC-1、ASPC-1和SW1990的杀伤作用.

主要产物LTB<sub>4</sub>的浓度明显下降, 这与TL抑制肿瘤细胞表达5-LOX是一致的(图4B).

2.3 过表达5-LOX增强SW1990抵抗TL诱导的凋亡 为探讨抑制5-LOX表达是否直接参与TL诱导的细胞凋亡, 构建了5-LOX表达质粒, 并筛选到稳定转染的SW1990细胞株(SW1990/5-LOX). Western blot检测野生型(Wt组)、转染空质粒(Pc3组)、转染5-LOX基因(5-LOX组)的SW1990细胞5-LOX蛋白表达水平, 结果显示(图5A), 在稳定转染的细胞株中, 5-LOX表达量是野生型SW1990的4倍左右. 此外, ELISA结果证实, 5-LOX组细胞培养上清中LTB<sub>4</sub>表达水平显著高于Wt组( $P<0.01$ , 图5B).

虽然细胞增殖结果表明, 5-LOX转染没有改变细胞正常的生长状态(数据未列出). 但我们发现, 50 μg/L TL处理以上三组细胞后, SW1990/5-LOX细胞死亡明显少于空质粒转染对照组和野生组( $P<0.05$ , 图6A). 而且, 50 μg/L TL处理24 h后凋亡细胞(以Annexin V阳性细胞计)也明显低于空质粒转染对照组(图6B,  $P<0.01$ ). 这些结果显示: 过表达5-LOX可以显著抑制TL诱导的SW1990细胞凋亡.

## 3 讨论

20世纪70年代以来, 我国医学工作者发现TL能够治疗多种白血病, 甚至使患者痊愈. 近几年对TL的抗肿瘤研究方兴未艾, 引起国内外医药界的广泛重视. 本研究发现, TL可以诱导人胰腺癌细胞增殖并诱导细胞凋亡, 提示TL可能开发成临床治疗胰腺癌的有效药物. 深入研究发现, TL可以抑制肿瘤细胞5-LOX基因的表达, 我们还证明, 下调5-LOX表达与TL促凋亡的作用密切相关.

研究表明<sup>[1]</sup>, 在胰腺癌及癌早期病变中均检测到5-LOX表达上调. 在人胰腺癌组织中, 免疫组化研究也证实5-LOX蛋白表达增加, 但在正常胰导管细胞中不表达5-LOX. 此外, 5-LOX下游

### ■应用要点

本研究结果显示TL通过抑制细胞5-LOX代谢诱导胰腺癌细胞凋亡, 加深了对TL抗肿瘤分子机制的理解, 提示TL具有潜在的用于临床治疗胰腺癌的价值.



### 同行评价

该文章研究方法先进, 讨论客观, 行文流畅, 对探索临床治疗胰腺癌新的药物, 有重要指导意义。




图 2 TL(50  $\mu$ g/L)诱导SW1990细胞凋亡. A: 0 h; B: 6 h; C: 12 h; D: 24 h.




图 3 胰腺癌细胞株5-LOX表达. A: 胰腺癌细胞株5-LOX蛋白; B: 胰腺癌细胞5-LOX mRNA.




图 5 稳定转染的SW1990细胞表达5-LOX蛋白和上清LTB<sub>4</sub>含量情况. A: 5-LOX; B: LTB<sub>4</sub>.




图 4 TL对SW1990细胞5-LOX和LTB<sub>4</sub>表达的影响. A: 5-LOX; B: LTB<sub>4</sub>.




图 6 过表达5-LOX对TL诱导的SW1990细胞凋亡的影响.

主要产物LTB<sub>4</sub>也在胰腺癌组织, 而不是正常导管细胞中有高水平表达, 这些结果提示, 5-LOX在胰腺癌高表达可能与肿瘤细胞发生发展有关. 已有研究发现, 5-LOX抑制剂通过抑制其酶活性可以抑制胰腺癌移植瘤的生长<sup>[12-13]</sup>. 在本研究中, TL被证明不仅能抑制5-LOX基因的表达, 而且可以抑制LTB<sub>4</sub>的生成. 这一方面加深了我们对TL作用机制的了解; 另一方面, 既然TL能抑制胰腺癌细胞中5-LOX代谢途径, 协同使用TL和特

异性酶抑制剂, 比如齐留通等, 能否进一步增强抗肿瘤效应是值得尝试的课题.

我们还观察到, 高表达5-LOX的胰腺癌细胞能在一定程度上抵抗TL诱导的凋亡作用. 这表明, 抑制5-LOX代谢途径与TL促凋亡的活性可能有直接的关系. 另外, 在临床治疗中, 常规化疗药物往往对胰腺癌患者没有明显效果<sup>[14]</sup>, 我

们推测, 胰腺癌细胞高表达5-LOX的特征可能与这种低反应性有关. 到目前为止, TL抑制胰腺癌细胞5-LOX表达的机制还不清楚, 早期研究提示, TL通过阻断NF- $\kappa$ B反式激活来发挥免疫抑制作用<sup>[15]</sup>. 在5-LOX基因启动子中, 存在数个与NF- $\kappa$ B相互作用的保守区<sup>[16]</sup>. TL是否通过NF- $\kappa$ B来抑制5-LOX表达还有待进一步研究.

#### 4 参考文献

- 1 Germanos S, Gourgiotis S, Stavrothanasopoulou A, Alepas P, Zampitis N, Panteli A. Diagnostic and therapeutic approach to pancreatic adenocarcinoma. *J Gastrointest Liver Dis* 2006; 15: 257-263
- 2 郭晓钟. 重视我国胰腺癌的研究现状及发展趋势. 世界华人消化杂志 2006; 14: 3161-3162
- 3 Ding XZ, Hennig R, Adrian TE. Lipoxygenase and cyclooxygenase metabolism: new insights in treatment and chemoprevention of pancreatic cancer. *Mol Cancer* 2003; 2: 10
- 4 周国雄, 丁晓凌. 花生四烯酸代谢通路与胰腺癌. 世界华人消化杂志 2008; 16: 1483-1486
- 5 Hennig R, Ding XZ, Tong WG, Schneider MB, Standop J, Friess H, Büchler MW, Pour PM, Adrian TE. 5-Lipoxygenase and leukotriene B(4) receptor are expressed in human pancreatic cancers but not in pancreatic ducts in normal tissue. *Am J Pathol* 2002; 161: 421-428
- 6 Chen BJ. Triptolide, a novel immunosuppressive and anti-inflammatory agent purified from a Chinese herb *Tripterygium wilfordii* Hook F. *Leuk Lymphoma* 2001; 42: 253-265
- 7 丁晓凌, 周国雄. 雷公藤内酯醇诱导肿瘤细胞凋亡的机制. 国际肿瘤学杂志 2006; 33: 259-261
- 8 Carter BZ, Mak DH, Schober WD, McQueen T, Harris D, Estrov Z, Evans RL, Andreeff M. Triptolide induces caspase-dependent cell death mediated via the mitochondrial pathway in leukemic cells. *Blood* 2006; 108: 630-637
- 9 Miyata Y, Sato T, Ito A. Triptolide, a diterpenoid triepoxide, induces antitumor proliferation via activation of c-Jun NH2-terminal kinase 1 by decreasing phosphatidylinositol 3-kinase activity in human tumor cells. *Biochem Biophys Res Commun* 2005; 336: 1081-1086
- 10 Livak KJ, Schmittgen TD. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method. *Methods* 2001; 25: 402-408
- 11 Hennig R, Grippo P, Ding XZ, Rao SM, Buchler MW, Friess H, Talamonti MS, Bell RH, Adrian TE. 5-Lipoxygenase, a marker for early pancreatic intraepithelial neoplastic lesions. *Cancer Res* 2005; 65: 6011-6016
- 12 Tong WG, Ding XZ, Witt RC, Adrian TE. Lipoxygenase inhibitors attenuate growth of human pancreatic cancer xenografts and induce apoptosis through the mitochondrial pathway. *Mol Cancer Ther* 2002; 1: 929-935
- 13 周国雄, 吴深宝, 黄介飞, 张弘, 魏群, 鄂群. 5-脂氧合酶特异性抑制剂对胰腺癌细胞增殖和凋亡的影响. 中华消化杂志 2005; 25: 689-691
- 14 Shi X, Liu S, Kleeff J, Friess H, Büchler MW. Acquired resistance of pancreatic cancer cells towards 5-Fluorouracil and gemcitabine is associated with altered expression of apoptosis-regulating genes. *Oncology* 2002; 62: 354-362
- 15 Qiu D, Zhao G, Aoki Y, Shi L, Uyei A, Nazarian S, Ng JC, Kao PN. Immunosuppressant PG490 (triptolide) inhibits T-cell interleukin-2 expression at the level of purine-box/nuclear factor of activated T-cells and NF-kappaB transcriptional activation. *J Biol Chem* 1999; 274: 13443-13450
- 16 Silverman ES, Le L, Baron RM, Hallock A, Hjoberg J, Shikanai T, Storm van's Gravesande K, Auron PE, Lu W. Cloning and functional analysis of the mouse 5-lipoxygenase promoter. *Am J Respir Cell Mol Biol* 2002; 26: 475-483

编辑 李军亮 电编 吴鹏联

ISSN 1009-3079 CN 14-1260/R 2008年版权归世界华人消化杂志

#### • 消息 •

### 世界华人消化杂志投稿方式

**本刊讯** 本刊只接受在线投稿, 不接受其他方式的投稿, 如E-mail, 印刷版. 在线投稿网址: <http://wcjd.wjgnet.com/submission@wjgnet.com>, 电话: 010-8538 1892, 传真: 010-8538-1893寻求帮助. 投稿须知下载网址<<http://www.wjgnet.com/1009-3079/tgxx.pdf>>审稿过程平均时间需要14 d. 来稿均经2-3位同行专家严格评审, 2位或以上通过为录用, 否则将退稿或修改后再审. 接受后的稿件作者需缴纳稿件处理费及发表费, 文章发表后可获得2本样刊及20套单行本(稿酬). (常务副总编辑: 张海宁 2008-12-08)